

СПИСОК ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Все пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений применяются в соответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

ГЕРОЛЬД, ВСК - высокоселективный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с листогрызущими вредителями. Применяется для борьбы с саранчовыми, а также для защиты яблони от яблонной плодовой гнили, листовых минеров, листогрызущих гусениц чешуекрылых, посадок капусты от комплекса чешуекрылых, неплодоносящих садов, декоративных насаждений, лесозащитных полос от американской белой бабочки. Наличие овицидного, ларвицидного и стерилизующего действия позволяет надежно и в течение продолжительного срока после обработки контролировать численность насекомых. Фитотоксичность отсутствует в рекомендуемых нормах расхода.

Уничтожение популяций вредителей, устойчивых к пиретроидам и ФОС

Снижение количества обработок в 2 - 3 раза по сравнению с обычными инсектицидами

Эффективная препаративная форма.

Может применяться в водоохранной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Не оказывает негативного влияния на полезных насекомых, хищных клещей и пчел.

БИ-58 Новый, КЭ - высокоэффективный системно-контактный инсектоакарицид широкого спектра действия для борьбы с вредными насекомыми и клещами.

Системное действие: препарат поглощается частями растений, а затем распределяется по всему растению, в основном акропетально. Сосущие насекомые погибают вследствие питания соком растения. Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях растения.

Контактное действие: выраженное контактное действие на насекомых-вредителей, находящихся в момент обработки на поверхности растения. Активно воздействует через покровы насекомого.

Устойчив к смыванию дождем. За счет проникновения внутрь растения имеет продолжительный защитный период (около 2 - 3 недель), который не зависит от погодных условий. Результат заметен уже через 3 - 4 часа после обработки, максимальный эффект наблюдается через 2 - 3 суток.

Клипер – современное средство для борьбы с гусеницами, бабочками, клещами и другими вредными насекомыми. Является фактически единственным средством для борьбы с короедом-типографом и другими стволовыми вредителями.

Принцип действия контактно-кишечный. Препарат после опрыскивания поглощается частями растений и распределяется по всей культуре. Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях. При попадании в организм вредителя поражает его нервную систему.

Инсектицид Клипер устойчив к смыванию дождем. За счет проникновения внутрь растения имеет продолжительный защитный период (около 2 - 3 недель), который не зависит от погодных условий. Результат заметен уже через 3 - 4 часа после обработки, максимальный эффект наблюдается через 2 - 3 суток.

Кроме этого, Клипер опосредованно снижает и поражение растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают листья и плоды, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции.

Препарат не фитотоксичен (относительно безвреден для человека), но последнюю обработку желательно проводить за 30 дней до сбора урожая.