

Для обработки зеленых насаждений будут применяться:

Топсин-М, СП – системный фунгицид для профилактики и лечения от таких видов грибов как: мучнистая роса, парша, оливковая бурая пятнистость, серая и белая гниль, антракноз, фузариоз, вертициллез, шютте (мериоз), трахеомикозное увядание. Защитное действие препарата длится до 1 месяца. Обработка проводится с интервалом 30 – 40 дней. Можно применять для лечения отдельных комнатных растений (орхидеи, азалии, цикламены).

Механизм действия: Благодаря системному действию быстро распределяется по всему растению. Топсин-М характеризуется уникальным соединением профилактического и лечебного воздействия на культуру, обладает искореняющим эффектом.

Преимущества:

- отличается высокой скоростью и одновременно – большой продолжительностью воздействия (более двух недель);
- имеет широкий спектр действия, что позволяет контролировать одновременно несколько заболеваний;
- может применяться в смеси практически со всеми инсектицидами, акарицидами и фунгицидами, за исключением щелочных препаратов.

Абига-Пик, ВС - медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия

Фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях. При воздействии на споры носителей болезней хлорокись меди выделяет активную медь, которая ингибирует их прорастание и дыхание. Активная медь подавляет множество жизненно необходимых белков у спор патогенов, что позволяет хлорокиси меди не вызывать сильной резистентности (т.е. привыкание патогенов к воздействию определенных химических веществ) у них.

Инсектицид-акарицид Клипер, КЭ – для борьбы с гусеницами, бабочками, клещами, короедам-типографам, стволовыми и другими вредителями.

Механизм действия: контактно-кишечный. Препарат после опрыскивания поглощается частями растений и распределяется по всей культуре. Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях. Устойчив к смыванию дождем.

Актара, ВДГ - инсектицид кишечного-контактного действия. Позволяет дополнить и заменить обработки инсектицидами из других химических классов, которые более токсичны для человека. Проявляет превосходную инсектицидную активность против сосущих (тли, цикадки, белокрылка, клоп вредная черепашка и др.), грызущих (различные жуки, пяденица, блошки и др.) и минирующих (минирующие моли) насекомых.

Преимущества:

- сохранение листового аппарата, улучшение качества продукции.
- низкая норма расхода, снижение числа обработок.
- эффективность независимо от внешних условий (сохраняет активность при высоких температурах, низкой влажности, устойчив к инсоляции, дождеустойчив).
- длительный защитный эффект.
- широкий спектр активности.
- трансламинарное (находящееся на листьях ДВ проникает на другую сторону листа) действие при опрыскивании растений.
- эффективность против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листа насекомых.

Все пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений применяются в соответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.